

Clenbuterol 0,02 mg Tabletten Sopharma Beipackzettel

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Es kann sein, dass Sie sie später erneut lesen müssen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an andere Personen weiter, auch wenn deren Symptome denen Ihrer ähneln.
- Wenn eine der Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

In dieser Packungsbeilage:

1. Was ist Clenbuterol Sopharma und wofür wird es verwendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Clenbuterol Sopharma beachten?
3. Wie ist Clenbuterol Sopharma einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Clenbuterol Sopharma aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Clenbuterol Sopharma und wofür wird es verwendet?

Clenbuterol Sopharma ist ein Arzneimittel mit bronchienerweiternder Wirkung. Es entspannt die glatte Muskulatur der Bronchien, verbessert deren Durchlässigkeit, beseitigt das Pfeifen und erleichtert das Atmen. Es wird zur Beseitigung von Bronchospasmen bei Asthma und anderen Lungenerkrankungen eingesetzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Clenbuterol Sopharma beachten?

Clenbuterol Sopharma darf nicht eingenommen werden:

- Wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Wenn Sie an Thyreotoxikose (Überfunktion der Schilddrüse) leiden.
- Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen: ischämische Herzerkrankung (verminderte Durchblutung des Herzmuskels), Bluthochdruck, hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie und Herzrhythmusstörungen (Tachyarrhythmie) oder Angina pectoris (Brustschmerzen).
- Wenn Sie kürzlich einen Herzinfarkt (Myokardinfarkt) erlitten haben.
- In den ersten drei Monaten der Schwangerschaft.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Clenbuterol Sopharma ist erforderlich:

- Informieren Sie Ihren behandelnden Arzt vor Beginn der Behandlung, wenn Sie an anderen Erkrankungen wie Prostatavergrößerung oder Diabetes leiden.
- Eine Langzeitbehandlung mit hohen Dosen Clenbuterol kann aufgrund seiner anabolen Wirkung zu einer Zunahme der Muskelmasse führen.
- Bei Sportlern kann es durch die Behandlung mit Clenbuterol zu einem positiven Dopingtest kommen.

Einnahme anderer Arzneimittel:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Clenbuterol kann die Wirkung einzelner Arzneimittel beeinflussen oder umgekehrt. Es sollte nicht gleichzeitig mit folgenden Arzneimitteln eingenommen werden:

- Andere Medikamente zur Behandlung von Bronchospasmen (z.B. Salbutamol, Theophyllin).
- Kortikosteroide, Diuretika (Entwässerungsmittel), Medikamente zur Behandlung von Herzinsuffizienz (Digitalis-Glykoside), Halothan und andere Narkosemittel, Medikamente zur Behandlung von Depressionen (MAO-Hemmer oder trizyklische Antidepressiva), Medikamente zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen (Schilddrüsenhormone) - erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen.
- Beta-Blocker (Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck, z.B. Propranolol, Atenolol, Metoprolol) und Clenbuterol können sich gegenseitig in ihrer Wirkung hemmen.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Clenbuterol Sopharma sollte nicht in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft sowie am Ende der Schwangerschaft angewendet werden, da es die Wehentätigkeit hemmen kann. Clenbuterol Sopharma wird nicht für stillende Frauen empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Bedienen von Maschinen:

Clenbuterol Sopharma kann Zittern der Hände und Unruhe verursachen, was beim Fahren und Bedienen von Maschinen besondere Vorsicht erfordert.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Clenbuterol Sopharma:

Dieses Arzneimittel enthält Laktose. Wenn Sie an einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden, sprechen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt.

Das Tablettengerüst enthält Weizenstärke. Für Personen mit Zöliakie besteht kein Risiko. Patienten mit einer Weizenallergie (andere als Zöliakie) sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen.

3. Wie ist Clenbuterol Sopharma einzunehmen?

Nehmen Sie Clenbuterol Sopharma immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Tabletten werden oral mit Flüssigkeit eingenommen. Die Dosierung und Dauer der Behandlung werden vom Arzt festgelegt. Wenn der Arzt nichts anderes verordnet, wird die Behandlung wie folgt durchgeführt:

- **Erwachsene:** 1 Tablette morgens und abends. Erhaltungsdosis: 1/2 Tablette 2-mal täglich. Bei schwereren Zuständen in den ersten Tagen 2 Tabletten morgens und abends. Nach Besserung der Symptome wird die Dosis reduziert.
- **Kinder ab 12 Jahren:** 1/2 Tablette 2-3 mal täglich oder 1 Tablette 2-mal täglich;
Kinder von 6-12 Jahren: 1/2 Tablette 2-mal täglich.

Für Kinder unter 6 Jahren wird die Anwendung der Darreichungsform Sirup empfohlen.

4. Mögliche Nebenwirkungen:

Wie alle Arzneimittel kann Clenbuterol Sopharma Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen umfassen:

- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Zittern der Gliedmaßen
- Nervosität
- Schlaflosigkeit
- Erhöhte Herzfrequenz
- Schmerzen im Brustbereich
- Erhöhter Blutdruck
- Hautausschlag
- Harnprobleme
- Extrem selten paradoxaler Bronchospasmus (Atemnot oder Keuchen), Vorhofflimmern, Myokardinfarkt (Herzinfarkt), was ein sofortiges Absetzen der Behandlung erfordert.

Wenn eine der Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder Sie andere Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie ist Clenbuterol Sopharma aufzubewahren?

- In der Originalverpackung aufbewahren, um es vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
 - Unter 25°C lagern.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Verwenden Sie Clenbuterol Sopharma nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum.
-

6. Weitere Informationen:

Was Clenbuterol Sopharma enthält:

- Der Wirkstoff ist Clenbuterolhydrochlorid 0,02 mg pro Tablette.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Mikrokristalline Cellulose, Laktosemonohydrat, kolloidales Siliciumdioxid, Weizenstärke, Magnesiumstearat, Povidon K25.

Wie Clenbuterol Sopharma aussieht und Inhalt der Packung:

Runde, flache Tabletten mit Facette und Bruchrille auf einer Seite, weiß, geruchlos. 10 Tabletten pro Blister aus Aluminiumfolie; 5 Blister in einer Kartonverpackung zusammen mit der Packungsbeilage.

Inhaber der Zulassung und Hersteller:

SOFARMA AD ul. Iliensko Shose 16, 1220 Sofia, Bulgarien

Datum der letzten Genehmigung der Packungsbeilage: November 2009.